



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د لوړو زده کړو وزارت

کندهار پوهنتون

د کرهڼې او مالدارۍ پوهنځی

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Higher Education

Kandahar University

Agriculture Faculty



ترتيب کوونکي: نادرشاه شاهي

موضوع

د بادرنګو د تخم تولید

Seed production of Cucumbers

ترتیب کوونکي: نادرشاه شاهي



ترتيب كوونكي: نادرشاه شاهي

بادرنگ يا Cucumber:

بادرنگ د سبزیجاتو له ډلې څخه شمیرل کیږي
چې لاتیني نوم یې (Cucumissativus) دي او
د (Cucurbitaceae) په کورني پوري اړه لري
په ټوله نړۍ کې مشهوره او په سلاټه او اچارو
کې زیات استعمالیږي.



ترتیب کوونکي: نادرشاه شاهي

د بادرنگو وده ايزي ځانگړتياوي:

بادرنگ د ۱۸ – ۲۴ سانتي گراد حرارت درجه کې په مناسبه توگه نمو کوي او د شرايطو سره سم په درو ورځو کې تيغ وهي د ۴۵ ورځو څخه وروسته لومړنۍ حاصل ورکوي نږدې په ۱۲۰ ورځو کې يې ټول حاصل په تدريجي ډول باندي راټوليزي.



ترتيب کوونکي: نادرشاه شاهي

د بادرنگو د بوټو تغذيه:

دا بوټي د تيزابي خاوري مقابل کبني بڼه مقاومت لري او د ۵.۵ څخه تر ۸.۶ پي ايچ پوري بڼه توليد ورکوي همدارنگه د خاوري د لا بڼه قوي کيدني لپاره د حيواني او کيمياوي کودونو څخه هم استفاده کيږي .



ترتيب کوونکي: نادرشاه شاهي

د بادرنگو د کښت تر منځ فاصله او ګرده افشاني:



ترتيب کوونکي: نادرشاه شاهي

د بادرنگو تخم د ۶۰ او ۹۰ سانتي متر په فاصله باندې
ايښودل کيږي او د ياد نبات تخمونه د دوه سانتي متر په
اندازه په خاورو کې د ننه ايښول کيږي وروسته تر ۱۵
ورځو څخه کتل کيږي او په هر ساحه کې يو يا دوه نباته
پاتيږي نوموړي سبزيجات د بيروني القاح لرونکي دي.
همدارنگه د بادرنگو د اساسي تخم د لاسته راوړولو لپاره د
فارمونو ترمنځ فاصله ۱۰۰۰ متره او د تصديق سوي تخم
لپاره ۵۰۰ متره فاصله ټاکل سوي.

د بادرنګو د کښت اوبه کول:

د کښت اوبه کول په لومړي ځل د تخم د شیندلو څخه او ورسته د یوې هفتې خورا مهم ګڼل کیږي خو اقلیم او رطوبت ته په کتلو دا اندازه تغیر کولای سي. خو د ګل او د میوي د تشکیل پر وخت د کښت لپاره اوبه د ډیر اهمیت وړ دي.



د بادرنگو د کښت پاکول:



د بادرنگو د کښت د نمو څخه بیا تر گل او میوي په ټولو وختونو کښي باید ناروغ او نا مطلوب نباتات لمنځه ویوړل سي يعني لومړي باید تر گل کولو مخکي پاک کړل سي بیا د گل پر وخت او اخیر کې د میوي د راټولولو پر خت باندي مهم گڼل کیږي.



ترتیب کوونکي: نادرشاه شاهي

د بادرنگو د حاصل جمع كول:



د بادرنگو حاصلات د لاسونو په وسیله صورت نیسي، وروسته بیا تخم د بادرنگو څخه ليري کيږي او په اوبو باندي پريولل کيږي تر څو سرينيناکه مواد ورڅخه بيل سي، وروسته بيا د يوي هفتي څخه تر لسو ورځو پوري وچيږي تر څو رطوبت يې ۷ فيصده ته ورسيږي.

د بادرنگ تخم په ازاد محيط کې د ۴ کالو او په تړلي محيط کې د ۱۰ کالو پوري ذخيره کيدای سي. د بادرنگو تخم د

۴۰۰ څخه ۷۰۰ کيلو گرام في هکتار لاسته راتلای سي. ترتيب کوونکي: نادرشاه شاهي

هنر

ترتیب کوونکی: نادرشاه شاہی



ترتيب كوونكي: نادرشاه شاهي